

Formation et développement IPUMS:

la demande de données

(Exercice 2 pour Stata)



Objectifs

- Créer et télécharger un extrait de données IPUMS PMA
- Décompresser le fichier de données et lire les données dans Stata
- Analyser les données en utilisant un exemple de code

Résumé

Comprendre la structure des ensembles de données de points de livraison de services IPUMS PMA et la manière dont ils peuvent être exploités pour explorer vos intérêts de recherche. Cet exercice utilisera ensemble de données IPUMS PMA pour explorer la relation entre les caractéristiques des points de livraison de services et en rupture de stock de contraceptives. Vous allez créer un extrait de données avec les variables EAID, FACILITYTYPEGEN, FACILITYADV, PILLOSBS, PILLOUTDAY, et URBAN; puis vous allez utiliser le code d'exemple à analyser les données.

Code Stata à réviser

Code	Résultat
<u>tabulate</u>	Affiche un tableau croisé pour jusqu'à 2 variables
<u>generate;</u> <u>replace</u>	La commande « generate » crée une nouvelle variable ; la commande « replace » permet de modifier une variable déjà existante
<u>if ()</u>	Opérateur conditionnel à utiliser avec la plupart des fonctions
Mean	Calcule la moyenne d'une variable continue

Erreurs courantes à éviter

- Confondre = avec ==, pour attribuer une valeur lors de la génération d'une variable, utilisez « = ». Utilisez « == » pour spécifier le cas où une variable est une valeur souhaitée à l'aide d'une commande logique IF.
- Oublier de mettre [fweight = weightvar] entre crochets

Enregistrement avec IPUMS

- Allez sur <http://pma.ipums.org>, cliquez sur « Register » pour utiliser IPUMS PMA sur le côté gauche de l'écran. Cliquez sur le bouton « Register for IPUMS PMA » et remplissez le formulaire pour demander l'accès. Vous devrez attendre que votre compte soit approuvé pour accéder aux données. Une fois que vous avez reçu l'email d'approbation, cliquez sur « Connect » en haut de la page et utilisez votre email et votre mot de passe.
- Aller à « Browse and Select Data »

CHOOSE THE UNIT OF ANALYSIS FOR DATA BROWSING	
PERSON	EACH RECORD WILL BE A PERSON DESCRIPTION
SERVICE DELIVERY POINT	EACH RECORD WILL BE A SERVICE DELIVERY POINT DESCRIPTION



- Choisissez l'unité d'analyse « Person »
- Cliquez sur la case « Select Samples, » cochez la case pour Kenya 2016 R5.

<input type="checkbox"/> Kenya	<input checked="" type="checkbox"/> 2016 R5	<input type="checkbox"/> 2015b R4	<input type="checkbox"/> 2014b R2
		<input type="checkbox"/> 2015a R3	<input type="checkbox"/> 2014a R1
- Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur l'option du bouton radio pour « All Cases (Respondents and Non-respondents to Service Delivery Point Questionnaires) ». La valeur par défaut est Facility Respondents.
- Cliquez sur la case « Submit Sample Selections. »

Sample Members

- Facility Respondents
 All Cases (Respondents and Non-respondents to Service Delivery Point Questionnaires)

À l'aide du menu déroulant ou de la fonction de recherche, sélectionnez les variables suivantes:

EAID: Zone de dénombrement (unité d'échantillonnage primaire)

FACILITYTYPEGEN: Type d'établissement

FACILITYADV: Etablissement avancé


PILULES: Pilules contraceptives observés et en stock ou en rupture de stock

PILLOUTDAY: Nombre de jours que les pilules contraceptives ont été en rupture de stock

URBAN: Statut urbain ou rural



- Cliquez sur le bouton violet VIEW CART sous votre panier de données.



- Vérifier la sélection des variables. Notez que certaines variables apparaissent dans votre panier même si vous ne les avez sélectionnés pas. Ils ne sont pas inclus dans le compte de variables dans votre panier de données. Ces variables présélectionnées sont nécessaires pour la pondération, l'estimation de la variance, ou pour identifier l'année, le pays, et le round d'un échantillon.

- Cliquez sur le bouton « Create Data Extract ».

- A côté de « Data Format », cliquez sur « Change ».

DATA FORMAT: .dat (fixed-width text) [Change](#)

- Sélectionnez Stata (.dta), puis cliquez sur Submit»
- Révisez l'écran « Extract Request Summary », décrivez votre extrait et cliquez sur « Submit Extract »
- Vous recevrez un email lorsque les données seront disponibles pour le téléchargement.
- Pour accéder à la page pour télécharger les données, suivez le lien dans l'e-mail ou le lien « My Data Extracts » sur la page d'accueil.



Lancer les données dans votre logiciel de statistiques

- Allez sur <http://pma.ipums.org> et cliquez sur « My Data Extracts »

Extract Number	Date	Formatted Data	Fixed-width Text Files					Basic	DDI
			Data	Command Files 	Codebook 	-	-		
36	2018-10-15	Download STATA	--	-	-	-	-		

- Faites un clic droit sur le lien de données à côté de l'extrait que vous avez créé.
- Choisissez « Save Target As... » (ou « Save Link As... »)
- Enregistrer dans « Documents » (qui devrait apparaître comme localisation par défaut)
- Trouver le dossier « Documents » dans le menu de démarrage.
- Faites un clic double sur le fichier « dta.gz »
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, appuyez sur le bouton « Extract »
- Un logiciel de décompression gratuit est disponible à l'adresse

<http://www.irnis.net/soft/wingzip/>

- Ouvrez le fichier « pma_000##.dta ».
- Comme cet exercice implique l'accès à un fichier .dta supplémentaire, utilisez la fonction Stata "cd" pour changer le répertoire de travail dans lequel vous avez enregistré vos fichiers Stata



Analyser l'échantillon

Partie 1: Explorer les types d'établissements de santé

1. Créez un tableau de fréquences pour FACILITYTYPEGEN indiquant la proportion de chaque type d'établissement enquêtée au Kenya, série 5.

```
tab facilitytypegen
```

2. Selon l'onglet « Universe », quels établissements sont inclus dans l'univers étudié pour FACILITYTYPEGEN? _____
3. Les utilisateurs doivent noter que de nombreuses variables de l'enquête sur les points de livraison de services (PLS) ont un univers défini par FACILITYADV, une désignation spécifique au pays de type « d'établissements avancés ». Créez un tableau croisé pour voir quels types d'établissements de la question précédente ont été désignés « établissements avancés » au Kenya pour 2016.

```
tab facilitytypegen facilityadv
```

4. Consultez l'onglet « Comparability » pour FACILITYADV, en prenant soin de noter que les désignations d'établissements avancés varient d'un pays à l'autre et varient parfois d'une enquête à l'autre dans un pays. Recherchez l'entrée Kenya et déterminez si sa désignation d'établissement avancé correspond à ce que vous avez trouvé à la question 3. La désignation est-elle concordante pour toutes les enquêtes Kényanes comprenant cette variable ? _____

Partie 2: Statistiques descriptives

5. Considérons la variable PILLOBS, qui indique si le PLS disposait d'un stock de pilules contraceptives observable le jour de l'entretien. Selon l'onglet « Codes », quelles sont les réponses possibles pour les PLS enquêtés au Kenya 2016? _____



6. Selon l'onglet « Comparability », les réponses possibles à PILLOBS peuvent varier d'un échantillon à l'autre. Comment? _____
7. Selon l'onglet « Universe », quels établissements sont inclus dans l'univers de l'enquête pour PILLOBS? _____
-
8. Parmi les établissements qui fournissent généralement les pilules contraceptives indiquées dans PILLOBS, quel type d'établissement était le moins susceptible d'avoir des réserves de pilules contraceptives en stock le jour de l'entretien ? Quelle proportion d'établissements de ce type était en rupture de stock ? (Limitez l'analyse aux seules interviews terminées et aux cas dans l'univers). _____
-

```
tab facilitytypegen pillobs if [pillobs < 90], row
```

Partie 3: Visualisation des données

9. Pour les établissements qui étaient en rupture de stock de pilules contraceptives, PILLOUTDAY indique le nombre de jours pendant lesquels les réserves étaient indisponibles. Pour certains PLS étant en rupture de stock depuis plus de 90 jours, les codes NIU et les valeurs manquantes pour PILLOUTDAY sont codés sous les valeurs 9994, 9997 et 9999 afin de dépasser la gamme de réponses valides.

Calculez la pénurie moyenne de pilules pour tous les établissements dans l'univers de PILLOUTDAY, en prenant soin d'exclure toute valeur supérieure à 9 000. Recherchez ensuite la moyenne de chaque type d'établissement dans FACILITYTYPEGEN et affichez le résultat sous forme d'histogramme (limitez l'analyse aux réponses valides des PLS dans l'univers pour PILLOUTDAY).



```
mean pilloutday if [pilloutday < 9000]  
mean pilloutday if [pilloutday<9000], over(facilitytypegen)  
graph hbar (mean) pilloutday if [pilloutday < 9000],  
over(facilitytypegen)
```

10. Supposons que vous soupçonnez que la différence apparente entre les établissements dans 9 est en réalité une disparité entre les types d'établissements les plus susceptibles de se trouver dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Créez une paire de graphiques à barres groupé par URBAN pour vérifier si cela est vrai. Existe-t-il des différences entre les établissements urbaines et ruraux de chaque type? _____
-

```
graph hbar (mean) pilloutday if [pilloutday < 9000],  
over(facilitytypegen) by(urban)
```

Partie 4: Combinaison de données PLS et HHF

Les utilisateurs doivent noter que PMA2020 a enquêté des établissements situés dans les mêmes zones d'échantillonnage que les ménages et les femmes lors de la même enquête. Ces données PLS ne sont pas censées être représentatives au niveau national. Au lieu de cela, ils sont destinés à décrire l'environnement de prestation de soins de santé des ménages et des femmes interrogées. Ainsi, il n'y a pas de poids d'échantillonnage pour les variables PLS.

Les fichiers contiennent un poids pour les unités d'échantillonnage EAWEIGHT, qui est un poids de probabilité représentant la possibilité que le secteur de dénombrement (EA) soit sélectionné pour l'échantillonnage. Les collecteurs des données originales ne recommandent pas d'utiliser EAWEIGHT pour pondérer les variables PLS. La meilleure



utilisation des variables PLS consiste plutôt de calculer des statistiques récapitulatives au niveau des SD et à les associer au jeu de données Ménage and Femme (HHF) à l'aide de la variable EAID en tant que source d'informations contextuelles pour l'environnement de prestation de services de chaque femme.

Par exemple, vous pouvez utiliser les variables PILLOBS et PILLOUTDAY pour déterminer si un établissement dans chaque EAID est en rupture de stock de pilules contraceptives et le nombre moyen de jours pendant lesquels les établissements de chaque EAID ont été en rupture de stock. Ces statistiques récapitulatives peuvent être combinées avec l'ensemble de données HHF afin de montrer si chaque femme répondante avait un accès local fiable aux pilules contraceptives.

11. Générez un tableau avec le nombre des femmes âgées de 15 à 49 ans (ÉLIGIBLE == 1) de l'échantillon Kenya 2016 de la série 5 HHF qui résidaient dans chacun des secteurs de dénombrement où les pilules contraceptives n'étaient pas disponibles dans tous les établissements locaux de l'enquête PLS? Combien de secteurs de dénombrement de Kenya 2016 satisfont à ces critères? _____

```
replace pillobs = 0 if (pillobs != 3)
replace pillobs = 1 if (pillobs ==3)
replace pilloutday = . if pilloutday > 9000
collapse (max) pillobs (mean) pilloutday, by (eaid)
count if (pillobs == 1)
```



12. Combinez PILLOBS et PILLOUTDAY avec l'ensemble de données Ménage et Femme (HHF) en faisant correspondre les EAID de tous les répondants. Combien des femmes âgées de 15 à 49 ans (ÉLIGIBLE == 1) de l'échantillon Kenya 2016 de la série 5 HHF résidaient dans chacun des secteurs de dénombrement où les pilules contraceptives n'étaient pas disponibles dans tous les établissements locaux de l'enquête PLS? (Notez que vous devrez remplacer ## par le numéro de votre extrait IPUMS PMA utilisé dans l'exercice 1).

```
merge 1:m eaid using "pma_000##"  
tab eaid if (pillobs == 1 & eligible == 1)
```

13. Effectuez une régression logistique pour estimer le lien entre les femmes qui prennent actuellement la pilule (FPNOWUSPILL) et la durée moyenne de la pénurie (PILLOUTDAY) pour chaque secteur de dénombrement qui était en absence de pilules le jour de l'interview PLS. Ajustez votre modèle pour qu'il soit représentatif des femmes kényanes utilisant FQWEIGHT. Considérez l'effet du nombre moyen de jours en rupture de stock comme une variable continue et un prédicteur de l'effet recherché. Recodez les valeurs pour FPNOWUSPILL qui ne sont pas dans l'univers ou qui manquent à zéro.

Existe-t-il un lien entre le nombre de jours pendant lesquels les établissements du secteur de dénombrement de la femme sont en rupture de stock de pilules et l'utilisation actuelle de la pilule par la femme pour la planification familiale?

```
replace fpnowuspill = 0 if fpnowuspill > 90  
replace pilloutday = 0 if pilloutday == .  
replace fqweight = round(fqweight)  
logistic fpnowuspill pilloutday [fweight = fqweight]
```



RÉPONSES - Analyse de l'échantillon

Partie 1: Explorer les types d'établissements de santé

1. Créez un tableau de fréquences pour FACILITYTYPEGEN indiquant la proportion de chaque type d'établissement enquêtée au Kenya, série 5.

Hospital: 79/428 = 18.46%

Dispensary: 190/428 = 44.39%

Health Center: 90/428 = 21.03%

Pharmacy / Chemist / Drug Shop: 48/428 = 11.21%

Health Clinic: 16/428 = 3.74%

Other: 4/428 = 0.93%

Other Health Facility: 1/428 = 0.23%

2. Selon l'onglet « Universe », quels établissements sont inclus dans l'univers étudié pour FACILITYTYPEGEN? Tous les points de livraison de services
3. Les utilisateurs doivent noter que de nombreuses variables de l'enquête sur les points de livraison de services (PLS) ont un univers défini par FACILITYADV, une désignation spécifique au pays de types « établissements avancés ». Créez un tableau croisé pour voir quels types d'établissements de la question précédente ont été désignées comme « établissements avancés » au Kenya pour 2016. Toutes sont avancées, à l'exception des pharmacies.
4. Consultez l'onglet « Comparability » pour FACILITYADV, en prenant soin de noter que les désignations d'établissements avancés varient d'un pays à l'autre et varient parfois d'une enquête à l'autre dans un pays. Recherchez l'entrée Kenya et déterminez si sa désignation d'établissement avancé correspond à ce que vous avez trouvé à la question C. La désignation est-elle concordante pour toutes les enquêtes Kényanes comprenant cette variable? Ils correspondent, et toutes les enquêtes kényanes interrogés ont la même désignation.



Partie 2: Statistiques descriptives

5. Considérons la variable PILLOBS, qui indique si le PLS disposait d'un stock de pilules contraceptives observable le jour de l'entretien. Selon l'onglet « Codes », quelles sont les réponses possibles pour les PLS enquêtés au Kenya 2016?

<u>1 - In-stock and observed</u>	<u>94 - Not interviewed (PLS questionnaire)</u>
<u>2 - In-stock but not observed</u>	<u>98 - No response or missing</u>
<u>3 - Out of stock</u>	<u>99 - NIU (not in universe)</u>

6. Selon l'onglet « Comparability », les réponses possibles à PILLOBS peuvent varier d'un échantillon à l'autre. Comment? Certains échantillons initiaux incluent moins de détails et fournissent des réponses dichotomiques selon que l'enquêteur a observé la pilule contraceptive en stock. Dans ces échantillons initiaux, si les pilules contraceptives n'étaient pas observées, elles étaient supposées être "en rupture de stock". Lors d'enquêtes ultérieures, les enquêteurs avaient l'option de signaler que les pilules contraceptives étaient "en stock mais pas observées".

7. Selon l'onglet « Universe », quels établissements sont inclus dans l'univers de l'enquête pour PILLOBS? Services de livraison fournissant des pilules contraceptives.
8. Parmi les établissements qui fournissent généralement les pilules contraceptives indiquées dans PILLOBS, quel type d'établissement était le moins susceptible d'avoir des réserves de pilules contraceptives en stock le jour de l'entretien? Quelle proportion d'établissements de ce type était en rupture de stock? (Limitez l'analyse aux seules interviews terminées et aux cas dans l'univers). Les cliniques de santé étaient les plus susceptibles de manquer de médicaments avec 25% de rupture de stock.



Partie 3: Visualisation des données

9. Pour les établissements qui... Calculez la pénurie moyenne de pilules pour tous les établissements dans l'univers de PILLOUTDAY, en prenant soin d'exclure toute valeur supérieure à 9 000. Recherchez ensuite la moyenne de chaque type d'établissement dans FACILITYTYPEGEN et affichez le résultat sous forme d'histogramme (limitez l'analyse aux réponses valides des PLS dans l'univers pour PILLOUTDAY).

Toutes les installations: 87


Clinique de santé: 33

Hôpital: 54

Dispensaire: 99


Centre de santé: 104

Pharmacie: 12



10. Supposons que vous soupçonnez que la différence apparente entre les établissements dans 9) est en réalité une disparité entre les types d'établissements les plus susceptibles de se trouver dans les zones urbaines par rapport aux zones rurales. Créez une paire de graphiques à barres groupé par URBAN pour vérifier si cela est vrai. Existe-t-il des différences entre les établissements urbaines et ruraux de chaque type?





Partie 4: Combinaison de données PLS et HHF

11. Générez un tableau avec le nombre des femmes âgées de 15 à 49 ans (ÉLIGIBLE == 1) de l'échantillon Kenya 2016 de la série 5 HHF qui résidaient dans chacun des secteurs de dénombrement où les pilules contraceptives n'étaient pas disponibles dans tous les établissements locaux de l'enquête PLS? Combien de secteurs de dénombrement de Kenya 2016 satisfont à ces critères?

43 secteurs de dénombrement

12. Combinez PILLOBS et PILLOUTDAY avec l'ensemble... Effectuez une régression logistique pour estimer le lien entre les femmes qui prennent actuellement la pilule (FPNOWUSPILL) et la durée moyenne de la pénurie (PILLOUTDAY) pour chaque secteur de dénombrement qui était en absence de pilules le jour de l'interview PLS. Ajustez votre modèle pour qu'il soit représentatif des femmes kényanes utilisant FQWEIGHT. Considérez l'effet du nombre moyen de jours en rupture de stock



comme une variable continue et un prédicteur de l'effet recherché. Recodez les valeurs pour FPNOWUSPILL qui ne sont pas dans l'univers ou qui manquent à zéro.

Ce sont les trois premiers:

EAID 4013 = 33 femmes

EAID 4163 = 47 femmes

EAID 4047 = 44 femmes

13. Existe-t-il un lien entre le nombre de jours pendant lesquels les établissements du secteur de dénombrement de la femme sont en rupture de stock de pilules et l'utilisation actuelle de la pilule par la femme pour la planification familiale?

La probabilité qu'une femme de l'échantillon utilise des pilules contraceptives reste la même quel que soit le nombre moyen de jours pendant lesquels son PLS local n'a pas été disponible (rapport de cotes = 1,000). Cependant, ce résultat n'est pas statistiquement significatif ($p = 0,728$, IC à 95% entre 0,998 et 1,002).

FPNOWUSPILL	Rapport de cotes	Valeur p	IC à 95%
PILLOUTDAY	1,000	0,728	(0,998 et 1,002)

